

## El mejillón cebra es una de las especies invasoras con más capacidad para provocar impactos


Desde los mares de Eurasia, Negro, Aral y Caspio, el mejillón cebra ha ido conquistando las latitudes templadas del hemisferio norte. Primero Europa, después Estados Unidos y ahora nos enfrentamos a la posibilidad de su proliferación en la Cuenca del Ebro.

### Siglo XIX en Europa

A Europa ya llegó a principios del siglo XIX a través de las grandes vías de navegación que fueron abriéndose en Europa central.

### El invasor viene de Rusia

A Estados Unidos llegó a mediados de los años 80 del siglo XX en el agua de lastre que muchos barcos mercantes llevaban en sus bodegas. Desde la zona de los grandes lagos ha ido extendiéndose hasta las costas del Caribe, por toda la cuenca del Mississippi y en un total de 26 Estados, ocupando gran parte del tercio oriental de la nación.



### 2001, año cero

El mejillón cebra llegó al curso fluvial del Ebro en julio de 2001, donde se localizó en el meandro de Flix y el embalse de Ribarroja. Desde entonces el avance ha sido vertiginoso, de tal forma que en 2004 llegó al embalse de Mequinenza y a principios del 2007 lo encontramos ya en el tramo alto de la cuenca, en el embalse de Sobrón (Burgos), sabiéndose también de su presencia en algunos tramos de la ciudad de Zaragoza.

Muchas embarcaciones utilizan la propia agua del mar como lastre. Esta agua que contiene larvas de mejillón puede ser arrojada a lagos o puertos a grandes distancias, facilitando un viaje que el mejillón no hubiera podido hacer por sí mismo.

El mejillón cebra es una especie invasora más, ya sea su llegada fortuita, introducida o por dispersión desde otras regiones. Como también lo son otras especies como el visón americano, el cangrejo rojo y el cangrejo señal, las cotorras argentinas y el galápago de Florida; también una gran variedad de las especies piscícolas (lucio, alburno, pez gato, siluro, black-bass...) y otros moluscos como la almeja asiática (*Corbicula fluminea*).

1 Percasol (*Lepomis gibbosus*) - 2 Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*) - 3 Mejillón cebra (*Dreissena polymorpha*) - 4 Almeja asiática (*Corbicula fluminea*) - 5 Lucio (*Esox lucius*) - 6 Siluro (*Silurus glanis*)

