

# GALACHO DE JUSLIBOL

Código masa: MAS973

Red de lagos

## DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO

Código masa: MAS973

Fecha de la actualización de la ficha: 11/10/2013

Tipología: 26\_Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo meandro abandonado

Red a la que pertenece:

Operativa  Referencia

Vigilancia  Investigación

Parámetros biológicos analizados:

Fitoplancton  Fauna bentónica invertebrada

Otra flora acuática

## LOCALIZACIÓN

Municipio: Juslibol

Provincia: Zaragoza

Comunidad Autónoma: Aragón

Coordenadas: Huso: 30

X(m): 672686

Y(m): 4619430

Altitud (m): 195


Número mapa 1:50.000: 354

### Ruta de acceso:

Entrar en Zaragoza por la salida 321 de la autovía A2 (salida Expo). En la rotonda que se encuentra a continuación ya está indicada la localidad de Juslibol. Seguir por la carretera hasta llegar a Juslibol. Cruzar el municipio en dirección al galacho (siguiendo las indicaciones).

Es necesario ponerse en contacto con el Centro de Interpretación para poder acceder con el coche hasta el galacho ya que existe una barrera al inicio del camino que impide la circulación de vehículos (a pie son unas 2 h de trayecto). También es necesaria una autorización especial para poder entrar con la barca. Es conveniente evitar las épocas de nidificación.

### Croquis:



## FOTOGRAFÍAS DEL LAGO



# PLANO DE SITUACIÓN



# GALACHO DE JUSLIBOL

Código masa: MAS973

Red de lagos

## ELEMENTOS FÍSICOQUÍMICOS

05/09/2012

Parámetros	Métricas	Valor	Estado
Transparencia	D.S. (m)	0,15	NA
	Color y aspecto del agua	Marrón claro. Agua turbia	
Condiciones térmicas	Temperatura (°C)	19,3	
Condiciones de oxigenación	Oxígeno disuelto (mg/L)	9,0	
Salinidad	Conductividad (µS/cm)	3.700	Moderado o inferior
Estado de acidificación	pH (unid.)	8,9	Bueno o superior
	Alcalinidad total (meq/L)	1,12	Muy bueno
Condiciones relativas a los nutrientes	NH <sub>4</sub> (mg/L)	0,15	
	NO <sub>3</sub> (mg/L)	0,425	
	NO <sub>2</sub> (mg/L)	<0,005	
	N <sub>total</sub> (mg/L)	2,9	
	P-PO <sub>4</sub> (mg/L)	<0,005	
	P <sub>total</sub> (mg/L)	0,185	Moderado o inferior

NA: No aplica la métrica para esa tipología.

**ESTADO ECOLÓGICO** Moderado o inferior

Profundidad	Temperatura	Conductividad	pH	Oxígeno		Clorofila	Turbidez
m	°C	µS/cm	unid.	mg/L	%	µg/L	NTU
0	19,3	3.700	8,9	9,0	98,6	48,0	41,9



# GALACHO DE JUSLIBOL

Código masa: MAS973

Red de lagos

## FITOPLANCTON

05/09/2012

Composición	Abundancia	Biovolumen	Cualitativo
	células/mL	mm <sup>3</sup> /L	
<b>Cyanobacteria</b>			
<i>Anabaenopsis circularis</i>	1.173	0,107	+
<i>Phormidium</i> cf. <i>okenii</i>			+
<i>Pseudanabaena catenata</i>	18.967	0,418	
<i>Pseudanabaena limnetica</i>	85.595	1,138	2
<i>Spirulina major</i>	7.621	0,048	2
<b>Coscinodiscophyceae</b>			
<i>Chaetoceros muelleri</i>	12.277	1,101	2
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	8.277	17,528	5
<b>Bacillariophyceae</b>			
<i>Navicula</i> sp.			2
<i>Nitzschia acicularis</i>	69	0,028	
<i>Nitzschia communis</i>	69	0,019	
<i>Nitzschia palea</i>	345	0,105	
<i>Nitzschia reversa</i>	276	0,685	1
<b>Cryptophyceae</b>			
<i>Chroomonas coerulea</i>	897	0,202	
<i>Cryptomonas marssonii</i>	207	0,113	
<i>Cryptomonas pyrenoidifera</i>	69	0,062	
<b>Euglenophyceae</b>			
<i>Euglena acus</i>	69	0,200	2
<i>Euglena ehrenbergii</i>			1
<i>Euglena limnophila</i> var. <i>minor</i>	69	0,103	2
<i>Euglena oxyuris</i>			2
<i>Euglena proxima</i>	276	3,436	2
<i>Euglena</i> sp.			1
<i>Trachelomonas volvocinopsis</i>	690	1,109	2
<b>Dinophyceae</b>			
Dinoflagelado	69	1,122	1
<b>Chlorophyceae</b>			
<i>Chlamydomonas</i> sp.	69	0,036	
<i>Chlorogonium elongatum</i>	552	0,500	
<i>Coelastrum astroideum</i>			+
<i>Monoraphidium arcuatum</i>	414	0,011	
<i>Monoraphidium contortum</i>	1.379	0,054	
<i>Monoraphidium komarkovae</i>	69	0,007	
<i>Monoraphidium minutum</i>	414	0,012	
<i>Scenedesmus acuminatus</i>	276	0,094	
<i>Scenedesmus obtusus</i>	276	0,029	
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	276	0,060	

Composición	Abundancia	Biovolumen	Cualitativo
	células/mL	mm <sup>3</sup> /L	
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	138	0,017	
<i>Schroederia setigera</i>	1.586	0,261	
<b>Trebouxiophyceae</b>			
<i>Micractinium pusillum</i>	690	0,111	+
<i>Nephrochlamys subsolitaria</i>	414	0,016	
<i>Oocystis marssonii</i>	276	0,150	
<i>Quadricoccus ellipticus</i>	276	0,014	
<b>Klebsormidiophyceae</b>			
<i>Elakatothrix gelatinosa</i>	138	0,012	
<b>TOTAL:</b>	<b>144.258</b>	<b>28,908</b>	
<b>Concentración de clorofila-a (µg/L) :</b>	<b>&gt;100,00</b>		

<b>Biovolumen total (mm<sup>3</sup>/L):</b>	NA
<b>Concentración de clorofila-a (µg/L) :</b>	168,73
<b>ESTADO ECOLÓGICO</b>	<b>Malo</b>

NA: No aplica la métrica para esa tipología.

Clases de abundancia	+	1	2	3	4	5
<b>Abundancia relativa</b>	presencia	<1%	1-10%	11-30%	31-60%	>60%

# GALACHO DE JUSLIBOL

Código masa: MAS973

Red de lagos

## VEGETACIÓN ACUÁTICA

05/09/2012

Hidrófitos	
Listado de especies	Cobertura promedio (%)
Zona de muestreo: Cubeta < 2m profundidad	
<b>Especies características para el tipo</b>	
<b>Especies no características para el tipo</b>	
<b>Especies exóticas</b>	
<b>Especies indicadoras de condiciones de eutrofia</b>	
<i>Spyrogyra</i> sp.	27,0
<b>Observaciones fuera de la zona de muestreo</b>	
<b>Zona somera de la cubeta colonizable por hidrófitos (%):</b>	<b>100</b>

Helófitos	
Listado de especies	Cobertura promedio (%)
Zona de muestreo: franja de 3 m desde orilla hacia fuera	
<b>Especies características para el tipo</b>	
<i>Carex cuprina</i>	<1
<i>Phragmites australis</i>	30,0
<b>Especies no características para el tipo</b>	
<i>Typha angustifolia</i>	30,0
<b>Especies exóticas</b>	
<i>Arundo donax</i>	0,5
<b>Especies indicadoras de condiciones de eutrofia</b>	
<b>Observaciones fuera de la zona de muestreo</b>	
<b>Zona somera de la cubeta colonizable por helófitos (%):</b>	<b>60</b>

Presencia/ausencia de hidrófitos	NA	Deficiente
Riqueza de especies de macrófitos	2	
Cobertura total de hidrófitos (%)	0,0	
Cobertura total de helófitos (%)	30,0	
Cobertura de especies (hidrófitos) indicadoras de eutrofia (%)	27,0	Moderado
Cobertura de especies (hidrófitos y helófitos) exóticas (%)	0,5	Muy bueno

NA: No aplica la métrica para esa tipología.

NA(1): No aplica el análisis del elemento "otra flora acuática" ya que la altitud es superior a 2.300 m.

NA(2): Sustrato colonizable por macrófitos <20% de la zona somera de la cubeta, no se tiene en cuenta el indicador "Otra flora acuática".

**ESTADO ECOLÓGICO** Deficiente





# GALACHO DE JUSLIBOL

Código masa: MAS973

Red de lagos

## FAUNA BENTÓNICA DE INVERTEBRADOS

05/09/2012

### Macroinvertebrados

Composición	Presencia
<b>Ph. MOLUSCA</b>	
Cl. Pulmonata	
O. Basommatophora	
F. Ferrissiidae	conchas
<b>Ph. ANELIDA</b>	
Cl. Oligochaeta	+
O. Tubificida	
F. Tubificidae	
Tubificidos c.s.c.	NI
<b>Ph. ARTHROPODA</b>	
Cl. Ostracoda	
Supercl. INSECTA	+
Cl. Euentomata	
O. Ephemeroptera	
F. Caenidae	+
O. Diptera	
F. Ceratopogonidae	+
F. Chironomidae	+
<b>Número de taxones:</b>	<b>6</b>

NI: No identificados. Se contabilizan en el Número de taxones

L: Larvas

P: Pupas

Exp: Exuvia de pupa

A: Adultos

### Microinvertebrados

Composición	Abundancia relativa (%)
<b>Cladóceros</b>	
<i>Ilyocryptus agilis</i>	12,5
<b>Copépodos</b>	
<i>Acanthocyclops robustus</i>	87,5
<b>Total (%):</b>	<b>100,0</b>

## Índice IBCAEL

Índice ABCO	0,0
Índice RIC	6,0
Índice IBCAEL	0,8

<b>ESTADO ECOLÓGICO</b>	<b>Malo</b>
-------------------------	-------------

# GALACHO DE JUSLIBOL

Código masa: MAS973

Red de lagos

## INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS

05/09/2012

**Tipología:** 26\_Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo meandro abandonado

<b>Superficie máxima (m<sup>2</sup>):</b>	545.000	<b>Superficie fecha de muestreo (m<sup>2</sup>):</b>	-
<b>Profundidad máxima (m):</b>	-	<b>Profundidad máxima fecha de muestreo (m):</b>	0,3
<b>Volumen máximo (m<sup>3</sup>):</b>	-	<b>Volumen fecha de muestreo (m<sup>3</sup>):</b>	-

### 1. ALTERACIONES DEL HIDROPERIODO Y DEL RÉGIMEN DE FLUCTUACIÓN DEL NIVEL DE AGUA

**Evaluación cualitativa:**

Regulación del caudal influente principal	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Aportes artificiales con concentraciones de nutrientes y mineralógicas distintas	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Masa de agua subterránea asociada sobreexplotada o en mal estado cuantitativo	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>
Existencia de drenajes	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Existencia de aprovechamiento hidroeléctrico activo	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Más del 50% de la cuenca vertiente presenta usos de suelo distintos al natural o semi-natural	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Cualquier otra alteración justificada por la Administración Hidráulica	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>

**Evaluación cuantitativa:**

Teledetección	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>
Hitos o limnógrafos	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>
Aforos en cursos fluviales influentes y efluentes	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>
Pluviómetros	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>
Batimetría	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>
Medida de piezómetros	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>
Tanques evaporimétricos	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>
Registros del nivel de agua	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones de la lámina de agua	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>

### 2. ALTERACIONES EN EL RÉGIMEN DE ESTRATIFICACIÓN

El indicador no aplica para este Tipo IPH

**Evaluación cualitativa:**

Actividades de regulación con incidencia en los procesos naturales de mezcla y estratificación	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Existencia de aprovechamiento hidroeléctrico activo	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Existencia de vertidos térmicos	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Régimen de estratificación alterado según la Administración Hidráulica	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>

**Evaluación cuantitativa:**

Modelo de simulación del proceso de estratificación/mezcla	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------	---

### 3. ALTERACIONES DEL ESTADO Y ESTRUCTURA DE LA CUBETA

**Evaluación cualitativa:**

Acumulación antrópica de los sedimentos	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Existencia de actividades de extracción de materiales	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Dragados	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Ahondamiento de la cubeta	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Presencia de infraestructuras artificiales en la cubeta	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Más del 50% de la cuenca vertiente presenta usos de suelo distintos al natural o semi-natural	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sin datos <input type="checkbox"/>
Alteraciones del estado y estructura de la cubeta según la Administración Hidráulica	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sin datos <input checked="" type="checkbox"/>

**Evaluación cuantitativa:**

Batimetría Si  No  Sin datos

Estudios de paleolimnología o sedimentología Si  No  Sin datos

**4. ALTERACIONES DEL ESTADO Y ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA**

**Evaluación cualitativa:**

Acumulación antrópica de materiales Si  No  Sin datos

Existencia de actividades de extracción de materiales Si  No  Sin datos

Roturación de la zona ribereña para usos agrícolas Si  No  Sin datos

Reducción de la cobertura natural de vegetación riparia Si  No  Sin datos

Actividad ganadera intensiva Si  No  Sin datos

Sobreerosión forzada por procesos antrópicos Si  No  Sin datos

Plantación de especies exóticas Si  No  Sin datos

Presencia de infraestructuras artificiales en la cubeta Si  No  Sin datos

Alteración del estado y estructura de la zona ribereña según la Administración Hidráulica Si  No  Sin datos

**Evaluación cuantitativa:**

Datos in situ Si  No  Sin datos

Fotografía aérea Si  No  Sin datos

# GALACHO DE JUSLIBOL

Código masa: MAS973

Red de lagos

## ESTADO ECOLÓGICO

05/09/2012

	Índice	Valor índice	Nivel calidad
<b>Fitoplancton</b>	Concentración de clorofila-a (µg/L)	168,73	Malo
	Biovolumen total	NA	
	<b>NIVEL DE CALIDAD</b>		Malo
<b>Otra flora acuática</b>	Presencia/ausencia de hidrófitos	NA	Deficiente
	Riqueza de especies de macrófitos	2	
	Cobertura total de hidrófitos (%)	0,0	
	Cobertura total de helófitos (%)	30,0	Moderado
	Cobertura de especies (hidrófitos) indicadoras de eutrofia (%)	27,0	
	Cobertura de especies (hidrófitos y helófitos) exóticas (%)	0,5	Muy bueno
<b>NIVEL DE CALIDAD</b>		Deficiente	
<b>Invertebrados</b>	IBCAEL	0,8	Malo
	<b>NIVEL DE CALIDAD</b>		Malo
<b>ESTADO ECOLÓGICO según elementos de calidad biológicos</b>			Malo

<b>Transparencia</b>	D.S. (m)	0,15	NA
<b>Salinidad</b>	Conductividad (µS/cm)	3.700	Moderado o inferior
<b>Estado de acidificación</b>	pH (unid.)	8,9	Bueno o superior
	Alcalinidad total (meq/L)	1,10	Muy bueno
<b>Condiciones relativas a los nutrientes</b>	P <sub>total</sub> (mg/L)	0,185	Moderado o inferior
<b>ESTADO ECOLÓGICO según elementos de calidad químicos</b>			Moderado o inferior

Alteraciones del hidroperíodo y del régimen de fluctuación del nivel de agua	Sin datos
Alteraciones del régimen de estratificación	NA
Alteraciones del estado y estructura de la cubeta	Sin datos
Alteraciones en el estado y estructura de la zona ribereña	Bueno o inferior
<b>ESTADO ECOLÓGICO según elementos de calidad hidromorfológicos</b>	Bueno o inferior

NA: La métrica no aplica para esa tipología.

NA(1): No aplica el análisis del elemento "otra flora acuática" ya que la altitud es superior a 2.300 m.

NA(2): Sustrato colonizable por macrófitos <20% de la zona somera de la cubeta, no se tiene en cuenta el indicador "Otra flora acuática".

NE: No evaluado

**ESTADO ECOLÓGICO DEL LAGO**

**Malo**



# GALACHO DE JUSLIBOL

Código masa: MAS973

Red de lagos

## FOTOGRAFÍAS

05/09/2012



Vista del galacho



Imagen de la vegetación en la zona litoral



Toma de muestras de invertebrados bentónicos



Mejillón cebra





## ADICIONAL INFORME GALACHO DE JUSLIBOL 2012

Durante el año 2022 se han revisado los datos del Galacho de Juslibol recopilados durante el año 2012, en aplicación del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, a partir de la trasposición de la Directiva Marco del Agua (DMA).

La metodología utilizada ha consistido en obtener del informe de dicho año los datos necesarios para estimar de nuevo el estado trófico y el estado ecológico y, recalcular el valor correspondiente en cada variable y en el estado final del lago, utilizando las métricas publicadas en 2015, lo que permite comparar el estado de los lagos en un ciclo interanual de forma homogénea.

En cada apartado considerado se indica la referencia del apartado del informe original al que se refiere este trabajo adicional.

### 1. EVALUACIÓN DEL ESTADO

El **estado** de una masa de agua es el grado de alteración que presenta respecto a sus condiciones naturales, y viene determinado por el *peor valor* de su estado ecológico y químico.

- El estado ecológico es una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales en relación con las condiciones de referencia (es decir, en ausencia de alteraciones). Se determina a partir de indicadores de calidad (biológicos y fisicoquímicos).
- El estado químico de las aguas es una expresión de la calidad de las aguas superficiales que refleja el grado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental de las sustancias prioritarias y otros contaminantes.

El estado de las masas de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado ecológico y estado químico.

El estado ecológico de las aguas superficiales se clasificará como muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo. Para clasificar el estado ecológico de las masas de agua

superficial se aplicarán los indicadores de los elementos de calidad, los valores del anexo II del Real Decreto 817/2015 y las NCA calculadas para los contaminantes específicos o en su caso, las NCA del anexo V para las sustancias preferentes.

El estado químico de las aguas superficiales se clasificará como bueno o no alcanza el buen estado. Para clasificar el estado químico se aplicarán las NCA de las sustancias incluidas en el Anexo IV del Real Decreto 817/2015 (sustancias prioritarias y otros contaminantes).

La clasificación del estado de las masas llevará asociado un nivel de confianza que se calculará conforme a los criterios especificados en el Anexo III B del citado Real Decreto.

La clasificación del estado ecológico se realizará con los resultados obtenidos para los indicadores correspondientes a los elementos de calidad biológicos, químicos y fisicoquímicos, e hidromorfológicos y vendrá determinado por el elemento de calidad cuyo resultado final sea el más desfavorable.

La clasificación del estado químico de una masa de agua se evalúa mediante el análisis de conformidad de la concentración de las sustancias prioritarias y otros contaminantes con las NCA recogidas en el Anexo IV. Corresponde a la clasificación peor de cada una de las sustancias del anexo IV.

## **2. ELEMENTOS DE CALIDAD BIOLÓGICOS (EC-BIO)**

### **2.1 Composición, abundancia y biomasa de Fitoplancton (EC-BIO)**

Datos obtenidos de una muestra integrada (MFIT) (dos veces al año): en marzo-mayo (lagos temporales); en mayo-agosto (lagos permanentes someros) y en julio-sept (lagos permanentes profundos).

Se aplica el protocolo MFIT-2013 Versión 2, utilizando dos métricas:

- Concentración de clorofila a (CONCLOA\_ZF). Fórmula tricromática de Jeffrey y Humphrey (1975). Media de los valores de las métricas durante los dos análisis.

- Biovolumen total de fitoplancton (BVOL\_T\_FTP). Sumatorio de biovolúmenes de los taxones de fitoplancton para cada análisis y el dato final será la media de los valores de biovolumen total obtenidos en los análisis de los dos muestreos anuales.

Para la evaluación del estado ecológico de las masas de agua de la categoría lago mediante el elemento de calidad fitoplancton, se deberá seguir el procedimiento descrito a continuación.

Las métricas de fitoplancton aplicables a lagos son únicamente aquellas que tienen en cuenta aspectos de abundancia y biomasa, es decir, la concentración de clorofila *a* y el biovolumen total de fitoplancton. Son dependientes del tipo de lago, y se consideran según la tabla A1.

**Tabla A1.** Métricas aplicables a los tipos de lagos para la evaluación del estado ecológico.

<b>Tipos</b>	<b>Clorofila a</b>	<b>Biovolumen fitoplancton</b>
1	Si	Si
2	Si	Si
3	Si	Si
4	Si	Si
5	Si	No aplicable
10	Si	Si
11	Si	Si
15	Si	Si
16	Si	No aplicable
18	Si	No aplicable
20	Si	No aplicable
21	Si	No aplicable
22	Si	No aplicable
23	Si	No aplicable
24	Si	No aplicable
26	Si	No aplicable

El fitoplancton es un indicador de respuesta trófica y, por lo tanto, integra todas las variables causales, de modo que está influido por otros condicionantes ambientales además de estarlo por los niveles de nutrientes. Se utilizan dos parámetros como estimadores de la biomasa algal en los índices: concentración de clorofila *a* en la zona fótica ( $\mu\text{g/L}$ ) y biovolumen total de fitoplancton ( $\text{mm}^3/\text{L}$ ).

Al contar en este estudio mayoritariamente con sólo una campaña de muestreo, y por tanto no contar con una serie temporal que nos permitiera la detección del máximo anual, se utilizan las clases de calidad relativas a la media anual (tabla A2). La utilización de los límites de calidad relativos a la media anual de clorofila se basó en el hecho de que los muestreos fueron realizados durante la estación de verano. Según la bibliografía limnológica general, el verano coincidiría con un descenso de la producción primaria motivado por el agotamiento de nutrientes tras el pico de producción típico de finales de primavera. Por ello, la utilización de los límites o rangos relativos al máximo anual resultaría inadecuada.

### Concentración de clorofila *a*

Del conjunto de pigmentos fotosintetizadores de las microalgas de agua dulce, la clorofila *a* se emplea como un indicador básico de biomasa fitoplanctónica. Todos los grupos de microalgas contienen clorofila *a* como pigmento principal, pudiendo llegar a representar entre el 1 y el 2 % del peso seco total. La clasificación del estado ecológico de acuerdo con la concentración de clorofila *a* se indica en la tabla A2.

**Tabla A2.** Límites de cambio de clase del estado ecológico y condición de referencia según tipo de lago y el RCE calculado de la concentración de clorofila *a*.

Límite de cambio de clase estado ecológico	Condición de referencia (mg/m <sup>3</sup> )	Muy Bueno / Bueno	Bueno / Moderado	Moderado / Deficiente	Deficiente / Malo
Tipo 1	1	0,67	0,45	0,30	0,15
Tipo 2	0,9	0,64	0,42	0,29	0,15
Tipo 3	1,3	0,68	0,49	0,34	0,17
Tipo 4	1,5	0,65	0,43	0,26	0,13
Tipo 5	1,8	0,62	0,37	0,24	0,13
Tipo 10	2,5	0,71	0,46	0,32	0,18
Tipo 11	1,6	0,67	0,40	0,28	0,13
Tipo 15	2,7	0,71	0,46	0,32	0,19
Tipo 16	3,8	0,68	0,42	0,23	0,15
Tipo 18	3,5	0,66	0,42	0,25	0,15
Tipo 20	3,5	0,61	0,37	0,25	0,13
Tipo 21	3,2	0,59	0,32	0,21	0,10
Tipo 22	3	0,58	0,38	0,26	0,13
Tipo 23	4,7	0,62	0,43	0,25	0,12
Tipo 24	4,9	0,63	0,46	0,26	0,12
Tipo 26	5,5	0,66	0,47	0,27	0,14

## Biovolumen algal

El biovolumen es una medida mucho más precisa de la biomasa algal, por tener en cuenta el tamaño o volumen celular de cada especie, además del número de células. La clasificación del estado ecológico de acuerdo al biovolumen de fitoplancton se indica en la tabla A3.

**Tabla A3.** Límites de cambio de clase del estado ecológico y condición de referencia según tipo de lago y el RCE del biovolumen algal del fitoplancton.

Límite de cambio de clase estado ecológico	Condición de referencia (mm <sup>3</sup> /L)	Muy Bueno / Bueno	Bueno / Moderado	Moderado / Deficiente	Deficiente / Malo
Tipo 1	0,7	0,64	0,38	0,24	0,12
Tipo 2	0,6	0,67	0,44	0,31	0,15
Tipo 3	1,4	0,67	0,55	0,37	0,18
Tipo 4	1	0,71	0,49	0,34	0,17
Tipo 10	0,7	0,58	0,34	0,26	0,13
Tipo 11	0,2	0,67	0,34	0,19	0,10
Tipo 15	1,5	0,65	0,48	0,32	0,19

- Cálculo de Ratio de Calidad Ecológico (RCE)

Se debe seguir el procedimiento descrito en el Protocolo MFIT-2013 Versión 2 para el cálculo del RCE de cada uno de los cuatro parámetros:

Cálculo para clorofila a:

$$RCE = [(1/Chla \text{ Observado}) / (1/Chla \text{ Condición de referencia})]$$

Cálculo para biovolumen:

$$RCE = [(1/biovolumen \text{ Observado}) / (1/ biovolumen \text{ Condición de referencia})]$$

Se utilizarán los valores de las Condiciones de Referencia (CR) de las métricas, para cada tipo de masa de agua, recogidos en la legislación.

- Transformación de RCE a escalas numéricas equivalentes

Los valores de RCE obtenidos se deben transformar a escalas numéricas equivalentes para normalizarlos a una escala lineal común.

Los Ratios de Calidad Ecológica transformados se obtendrán mediante la aplicación de la siguiente fórmula, que no es más que una interpolación lineal entre los límites de

cambio de clase de los Ratios de Calidad Ecológica que se han establecido para cada indicador, y los que se corresponden con una escala lineal.

$$RCE\_trans = Val.trans_i + (RCE-Val_i) \times (Val.trans_s - Val.trans_i) / (Val_s - Val_i)$$

Donde:

- RCE\_trans = Ratio de Calidad Ecológica transformado
- RCE = Ratio de Calidad Ecológica sin transformar
- Val.trans<sub>i</sub> = Valor de RCE de cambio de clase estado ecológico inferior transformado
- Val<sub>i</sub> = Valor de RCE de cambio de clase de estado ecológico inferior sin transformar
- Val.trans<sub>s</sub> = Valor de RCE de cambio de clase de estado ecológico superior transformado
- Val<sub>s</sub> = Valor de RCE de cambio de clase de estado ecológico superior sin transformar

Se utilizarán para cada tipo de masa de agua los valores del RCE de las métricas recogidos en la legislación, con los que se comparará el RCE sin transformar de la muestra (Val<sub>i</sub>). Los valores de RCE de cambio de clase de estado ecológico superior sin transformar (Val<sub>s</sub>) –que constituyen el límite superior de una clase de estado ecológico– se calcularán como el valor inmediatamente inferior con 2 decimales de los valores del RCE de cambio de clase de estado ecológico inferior sin transformar, recogidos en la legislación.

Para el cálculo, se utilizarán los Val.trans<sub>s</sub> y Val.trans<sub>i</sub> que figuran en la tabla siguiente:

Clase de estado	Valores de RCE de cambio de clase de estado ecológico superior transformado (Val.trans <sub>s</sub> )	Valores de RCE de cambio de clase de estado ecológico inferior transformado (Val.trans <sub>i</sub> )
Muy bueno	1,00	0,80
Bueno	0,79	0,60
Moderado	0,59	0,40
Deficiente	0,39	0,20
Malo	0,19	0,00

- Combinación de RCE transformados para la clasificación del estado ecológico

La combinación de los RCE transformados de los indicadores para la clasificación del estado ecológico del elemento de calidad composición, abundancia y biomasa de fitoplancton se realizará utilizando la siguiente fórmula:

$RCE\ trans\ final\ (MFIT) = 0,75\ RCE\_trans\ (CONCLOa) + 0,25\ RCE\_trans\ (BVOLTOT)$

El valor final de la combinación de los RCE transformados (RCE trans final) se utilizará para la clasificación del estado ecológico, de acuerdo a la escala de clases de estado ecológico indicada en el apartado anterior.

## **2.2. Composición y abundancia de Otra Flora Acuática (macrófitos) (EC-BIO)**

El cálculo se realiza a partir de una muestra anual realizada en un momento favorable para la vegetación.

Se sigue el protocolo OFALAM-2013. Se elige el peor valor del índice que posee varias métricas (OFALAM). No se aplica en lagos de los tipos 1 a 4 situados a más de 2300m de altitud.

- Presiones de tipo HM: Se hace la media. (OFALAM\_P\_HM)
  - Presencia/Ausencia de hidrófitos (PRESENCIA\_HID): tipos 1-8, y entre éstos, sólo en aquéllos que de manera natural puedan tenerlos. Se excluyen lagos situados a altitud mayor a 2300m, que discrimina a algunos de los lagos de los tipos de alta montaña (tipos 1-4).
  - Riqueza de especies de macrófitos típicos (RIQ\_SPS\_MAF): tipos 10-12, 14-19 y 24-29.
  - Cobertura total de hidrófitos típicos (COBER\_T\_HID): tipos 10-12, 14-16, 18 y 20-29.
  - Cobertura total de helófitos típicos (COBER\_T\_HEL): tipos 10-12, 14-16, 18 y 20-29.
  - Cobertura total de macrófitos típicos (hidrófitos+helófitos) (COBER\_T\_MAF\_L): se aplica sólo a los tipos de lagos con hidropериodo temporal (tipos 17 y 19). No hay en la CHE de esas tipologías.
- Presión por eutrofización: Se coge el valor de cobertura de especies de macrófitos indicadoras de condiciones eutróficas (COBER\_SPS\_EUT): todos los tipos de lagos naturales excepto en los tipos 9, 13 y 30 (que no se encuentran en la Demarcación del Ebro).
- Presión por introducción de especies exóticas: Se coge el valor de cobertura de especies exóticas de macrófitos (COBER\_SPS\_EXO): todos los tipos de lagos naturales excepto en los tipos 9, 13 y 30 (que no se dan en la CHE).

### 2.3. Composición y abundancia de Fauna bentónica de Invertebrados (EC-BIO).

Se toma una muestra anual. Se sigue el protocolo ML-L-I-2013 e IBCAEL 2013. Se coge el valor del índice (IBCAEL). La fórmula de cálculo es la siguiente:

$$IBCAEL = (ABCO + 1) \times \log(RIC + 1)$$

El índice ABCO (ABUN\_BCO) se obtiene a partir de una muestra de microinvertebrados bentónicos.

El índice RIC (RIC) se obtiene a partir de una muestra de macroinvertebrados bentónicos.

### 3. ELEMENTOS DE CALIDAD FISICOQUÍMICOS (EC-FQ)

Se debe tomar cuatro muestras anuales de la zona fótica, calculándose hasta 2019 como la media de los valores anuales. A partir de 2020 se calcula con la mediana de los valores anuales como establece la Guía de Estado. Si solo se ha realizado un muestreo, se tomará ese único valor.

Se elige el peor valor entre los siguientes indicadores de calidad (MIN\_FQ) según los rangos señalados en RD 817/2015:

ELEMENTOS DE CALIDAD FQ (EC-FQ)	INDICADORES DE CALIDAD FQ (IC-FQ)
Transparencia	Disco de Secchi (tipos 1-7, 9-12 y 14-15) (SECCHI)
Estado de acidificación	pH (PH_ZF) (todos los tipos)
Condiciones relativas a nutrientes	P total (P_TOT) (tipos 1-12, 14-24 y 26-30)

#### 3.1. Transparencia

La transparencia es un elemento válido para evaluar el estado ecológico del lago; tiene alta relación con la productividad biológica; y además tiene rangos establecidos fiables y de utilidad para el establecimiento de los límites de clase del estado ecológico. Se ha evaluado a través de la profundidad de visión del disco de Secchi (DS), considerando su valor para la obtención de las distintas clases (tabla A4).



**Tabla A4.** Límites de cambio de clase de estado ecológico según la profundidad de visión del Disco de Secchi estimada en metros.

Clase de estado ecológico	Muy Bueno/Bueno	Bueno/Moderado
Tipo 1	6,0	4,5
Tipo 2	6,0	4,0
Tipo 3	4,5	3,0
Tipo 4, 10, 15	4,0	3,0
Tipo 5, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26	No considerado	

### 3.2. pH

El pH es un elemento válido para evaluar el estado ecológico del lago; tiene alta relación con la productividad biológica; y además tiene rangos establecidos fiables y de utilidad para el establecimiento de los límites de cambio de clase de estado ecológico. Se ha utilizado la medida de pH, considerando su valor para la obtención de las distintas clases (tabla A5).

**Tabla A5.** Límites de cambio de clase de estado ecológico según el valor de pH.

Clase de estado ecológico	Bueno/Moderado	Moderado/Deficiente
Tipo 1, 3	6,0 - 9,0	$\leq 6$ o $\geq 9$
Tipo 2, 4, 15, 18, 24, 26	7,0 - 9,5	$\leq 7$ o $\geq 9,5$
Tipo 5	6,0 - 9,5	$\leq 6$ o $\geq 9,5$
Tipo 10, 11	7,0 - 9,7	$\leq 7$ o $\geq 9,7$
Tipo 16	6,5 - 9,5	$\leq 6,5$ o $\geq 9,5$
Tipo 20, 21, 22, 23	7,5 - 10,5	$\leq 7,5$ o $\geq 10,5$

### 3.3. Concentración de nutrientes

En este caso se ha seleccionado el fósforo total (P\_TOT), ya que su presencia a determinadas concentraciones en un lago o masa de agua supone procesos de eutrofización, pues en la mayoría de los casos es el principal elemento limitante para el crecimiento de las algas.

Se ha empleado el resultado obtenido en la muestra integrada, considerando los criterios de la OCDE especificados en la tabla A6 (OCDE, 1982) adaptado a los intervalos de calidad del RD 817/2015.

**Tabla A6.** Límites de cambio de clase de estado ecológico según la concentración de fósforo total estimado en µg/L.

Clase de estado ecológico	Muy Bueno/Bueno	Bueno/Moderado
Tipo 1, 2	8,0	12,0
Tipo 3, 4	12,0	18,0
Tipo 5	18,0	26,0
Tipo 10	16,0	28,0
Tipo 11	12,0	22,0
Tipo 15	16,0	28,0
Tipo 16*	20,0	45,0
Tipo 18*	22,0	50,0
Tipo 20, 21, 22, 23*	40,0	100,0
Tipo 24, 26*	30,0	80,0

\* En lagunas someras de los tipos 16 al 30, en caso que la abundancia de la avifauna justifique los valores elevados de P\_TOT, esta variable no se considerará en el cálculo.

Si se toman varios datos anuales, se hace la *mediana* de los valores anuales.

### 3.4. Sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca

Dentro de los indicadores fisicoquímicos también se tienen en cuenta las **sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca**. El valor medio de los datos anuales se revisa para ver si *cumple o no con la Norma de Calidad Ambiental (NCA) del Anexo V del RD 817/2015*. Si *incumple* supone asignarle para los indicadores fisicoquímicos la categoría de *moderado* (tabla A7).

**Tabla A7.** Límite de cambio de clase de estado ecológico para sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca.

Clase de estado ecológico	Muy Bueno	Moderado
Sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca	Cumple NCA	No cumple NCA

## 4. ELEMENTOS DE CALIDAD HIDROMORFOLOGICO (EC-HM)

Se realiza una toma de muestras anual, y del resultado obtenido se elige el peor valor.

- Alteración del hidroperiodo y del régimen de fluctuación del nivel del agua (ALT\_HID\_NIV)
- Alteración del régimen de estratificación (ALT\_REG\_EST)
- Alteración del estado y estructura de la cubeta (ALT\_EST\_CUB)
- Alteración del estado y estructura de la zona ribereña (ALT\_EST\_RIB)

## 5. CALCULO DEL ESTADO ECOLÓGICO FINAL (EF)

Para el cálculo del Estado Ecológico (EEco) se consideran el estado Biológico, el estado Físicoquímico y el estado Hidromorfológico, de la siguiente manera:

EC-BIO (EE_BIO)	EC-FQ (EE_FQ)	EC-HM (EE_HM)	EEco (EE)
MuyBueno (1-MB)	MB (1-MB)	MB (1-MB)	MB (1-MB)
	BU (2-BU)	MB/BU	BU (2-BU)
	MO (3-MO)		MO (3-MO)
Bueno (2-BU)	MB/BU	MB/BU	BU (2-BU)
	MO		MO (3-MO)
Moderado (3-MO)	Indistinto	Indistinto	MO (3-MO)
Deficiente (4-DE)			DE (4-DE)
Malo (5-MA)			MA (5-MA)

El estado químico es “*no bueno*” cuando hay algún incumplimiento de la Norma de Calidad Ambiental, bien sea como media anual (NCA\_MA), como máximo admisible (NCA\_CMA) o en la biota (NCA\_biota) para las **sustancias prioritarias y otros contaminantes** (tabla A8). Las NCA se recogen en el *Anexo IV del RD 817/2015*.

**Tabla A8.** Clases de estado químico para sustancias prioritarias y otros contaminantes.

Clase de estado químico	Bueno	No alcanza el buen estado
Sustancias prioritarias y otros contaminantes	Cumple NCA	No cumple NCA
Valoración de cada clase	2	3

Al comparar los resultados para cada métrica con los umbrales establecidos en el RD 817/2015, se ha tenido en cuenta que en el caso de que el resultado coincida exactamente con el LCC (límite de cambio de clase):

- Para EC-BIO y EC-FQ gales, se considerará en la clase inferior con NFC alto.
- Para EC-HMF, se considerará en la clase superior con NFC bajo.
- Para EC-FQ contaminantes específicos, se considerará que cumple la NCA pero con NFC bajo.

El estado de la masa de agua es el *peor valor* entre su estado ecológico y su estado químico según el diseño de la tabla A9.

**Tabla A9.** Determinación del estado final.

<b>Estado Final (EF)</b>	<b>Estado Químico (EQ)</b>	
<b>Estado Ecológico (EE)</b>	Bueno	No alcanza el buen estado
Bueno o superior	Bueno	Inferior a bueno
Moderado	Inferior a bueno	
Deficiente		
Malo		

## DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL GALACHO DE JUSLIBOL (MAS 973)

Se han considerado los indicadores especificados en los apartados anteriores para los valores medidos en el lago, estableciéndose el estado ecológico global del lago según la metodología descrita con los límites de clase indicados para la tipología nº 26.

En la tabla A10 se incluye el estado ecológico indicado por cada uno de los parámetros, así como la catalogación de la masa de agua teniendo en cuenta los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos según la valoración de este estado ecológico final para cada campaña de muestreo.

**Tabla A10.** Diagnóstico del estado ecológico según los indicadores.

INDICADOR	VALOR	ESTADO ECOLOGICO
<b>INDICADORES DE CALIDAD HIDROMORFOLÓGICOS</b>		Bueno
<b>INDICADORES DE CALIDAD FISICOQUÍMICOS</b>		
DISCO SECCHI (m)	0,15	NC*
pH	8,90	Bueno
CONCENTRACIÓN P TOTAL (mg/L)	0,185	Moderado
<b>INDICADORES DE CALIDAD BIOLÓGICOS</b>		
CLOROFILA a (µg/L)	168,73	Malo
BIOVOLUMEN ALGAL (mm <sup>3</sup> /L)	28,91	NC*
FITOPLANCTON (EE_MFIT)		Malo
COBERTURA DE ESPECIES INDICADORAS DE EUTROFIA (NºEspecies)	27,0	Moderado
COBERTURA DE ESPECIES EXÓTICAS (NºEspecies)	0,2	Muy Bueno
HIDRÓFITOS (Presencia/ Ausencia)	-	NC*
COBERTURA HELÓFITOS (%)	40,0	Moderado
COBERTURA HIDROFITOS (%)	0,0	Malo
RIQUEZA DE MACRÓFITOS (Nº especies)	2,0	Deficiente
OTRA FLORA ACUÁTICA (EE_OFALAM)		Deficiente
ÍNDICE IBCAEL	0,85	Malo
INVERTEBRADOS (EE_IBCAEL)		Malo

NC: No Considerado para el cálculo del estado ecológico en esta tipología de lago.

Atendiendo a estos valores, el Estado Ecológico sería el siguiente:

**Tabla A11.** Diagnóstico del estado ecológico.

INDICADOR	Código de estado	Nivel de estado
HIDROMORFOLÓGICO	EE_HM	Bueno
FISICOQUÍMICO	EE_FQ	Moderado
BIOLÓGICO	EE_BIO	Malo
ESTADO ECOLÓGICO	EE	Malo

No se han realizado otros muestreos químicos en este año.

A la vista de los resultados obtenidos, el Estado Final del Galacho de Juslibol es **INFERIOR A BUENO.**